

## Behandelschema: BEACOPP escalated kuren bij de ziekte van Hodgkin

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De BEACOPP escalated kuur bestaat uit een combinatie van acht medicijnen. Een kuur bestaat uit: dag 1, 2, 3 en 8 een infuus en dag 1 t/m 14 tabletten/capsules. De kuur wordt eenmaal per drie weken gegeven. Het totaal aantal kuren (maximaal 8) wordt in overleg met u vastgesteld. De kuur wordt op dag 1 klinisch gegeven. Alle andere dagen kan de behandeling poliklinisch plaatsvinden.

### Het verloop van de kuur:

1. Medicijnen die u via een infuus krijgt:

Etoposide:	dag 1, 2, 3
Doxorubicine:	dag 1
Cyclofosfamide:	dag 1
Mesna:	dag 1
Vincristine:	dag 8
Bleomycine:	dag 8

2. Medicijnen die u per tablet krijgt:

Procarbazine:	dag 1 t/m 7
U kunt de Procarbazine alleen maar verkrijgen via de Jeroen Bosch Apotheek.	
Prednisolon:	dag 1 t/m 14
Granisetron:	dag 1 t/m 3, 2mg p.o, 1 uur voor de kuur innemen
Cotrimoxazol:	continue 1x daags 480 mg, gebruik tot 3 maanden na laatste kuur.
Ciprofloxacin:	continue 2x daags 500 mg, gebruik tot 3 maanden na laatste kuur.
Metoclopramide:	Zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar

Medicijnen die u per injectie onderhuids krijgt:

Lipegfilgrastim s.c.: dag 4

Vóór de toediening van de cytostatica via het infuus krijgt u medicijnen toegediend om eventuele misselijkheid en braken zoveel mogelijk te voorkomen.

Op dag 1 duurt de behandeling ± 9 uur. U wordt dan op de afdeling opgenomen. Als de gehele behandeling achter de rug is, mag u huiswaarts. Op de dag 2, 3 en 8 duurt de behandeling ± 2 uur. Deze wordt op de dagbehandeling gegeven.

### Controles:

Controle van het bloed: vóór start nieuwe kuur en indien nodig

Controle bij de arts/verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe kuur en indien nodig

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de mogelijkheid dat de kuur een week wordt uitgesteld.

### Mogelijke bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- invloed op de werking van het beenmerg
- vermoeidheid
- haaruitval

- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- verandering van de huid
- irritatie / branderige ogen

### **Specifieke aandachtspunten**

- tegen eventuele misselijkheid kunt u bij uw eigen apotheek medicijnen ophalen. De arts geeft u hiervoor een recept mee.
- Vincristine kan (ernstige) verstopping geven
- de urine kan rood gekleurd zijn van de medicijnen op dag 1
- op de dag van de toediening van de Bleomycine kunt u (hoge) koorts krijgen. Dit verdwijnt gewoonlijk weer binnen 24 uur. U mag hier een tablet Paracetamol 500 mg voor innemen.
- tijdens het slikken van de Procarbazine kan een griepachtig gevoel optreden. Zonodig mag u daarvoor een tablet Paracetamol 500 mg innemen.
- ontstekingen van het mondslijmvlies is een veel voorkomende klacht bij deze behandeling
- bij deze behandeling begint uw haar ± drie weken na de eerste kuur uit te vallen
- op dag 1 is het belangrijk om veel te drinken, 2½ liter
- alcoholgebruik wordt afgeraden tijdens het gebruik van Procarbazine
- soms kan de toediening van chemotherapie leiden tot ontsteking van de long, soms gepaard gaand met verbindweefseling van de longen. U kunt dit ervaren als (toegenomen) benauwdheid en/of droge hoest. Neem contact op met het ziekenhuis indien u klachten krijgt!
- Perifere neuropathie. U kunt klachten krijgen van een dof, dood gevoel in vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit wordt veroorzaakt door een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg, maar het kan zo zijn dat de klachten naarmate u meer kuren krijgt, op de voorgrond komen te staan. Soms zijn deze klachten dan continue aanwezig. U dient dit altijd te melden bij een volgend polibezoek. Preventief kan er niets aan deze bijwerking gedaan worden, maar verergering zal voorkomen moeten worden door eventuele aanpassing van de dosering van de kuur.
- op de dag van de toediening van de Bleomycine kan u (hoge)koorts krijgen. Dit verdwijnt gewoonlijk weer binnen 24 uur. Hier mag een tablet paracetamol 500 mgr voor ingenomen worden.
- de chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer. De duur van aanwezigheid in de uitscheiding is per middel:
  - Procarbazine en Vincristine: 2 dagen
  - Bleomycine en cyclofosfamide: 3 dagen
  - Etoposide: 5 dagen
  - Doxorubicine: 6 dagen

### **Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Prednison:**

- Prednison kan de eetlust verhogen
- Prednison kan stemmingswisselingen geven
- Prednison kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen

- Prednison kan vocht in het lichaam vasthouden
- soms hebben mensen ten gevolge van Prednison wat moeite met inslapen
- na het stoppen van de prednison kunt u zich wat lusteloos voelen

### **Voorzorgsmaatregelen**

Procarbazine valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en heeft enkele voorzorgsmaatregelen:

- de tabletten dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven
- het breken en/of malen van Procarbazine is niet toegestaan
- zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de tabletten in te nemen
- na het innemen van Procarbazine wast u direct uw handen
- de verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil afgevoerd kan worden

### **Gebruiksaanwijzing**

- neem de tabletten van de in volgens voorschrift van de arts
- neem de tabletten in binnen 30 minuten na het beëindigen van een maaltijd (ontbijt of avondeten)
- slik de tabletten zonder kauwen door met water

### **Als u een dosis bent vergeten**

- verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- indien u braakt na de inname van de tabletten, neem dan niet onmiddellijk opnieuw tabletten in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

### **Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de volgende maatregelen :**

- trek handschoenen aan voor het uitpakken van de tablet
- geef de tablet rechtstreeks in de mond
- handschoenen uittrekken en deze tezamen met de verpakking van de medicatie in een dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren
- was daarna u handen