

Behandelschema AML 1-3-5 schema bij acute myeloïde leukemie

Er is bij u onlangs de ziekte acute myeloïde leukemie vastgesteld, waarvoor u reeds behandeling hebt ondergaan. Echter hierop heeft de leukemie onvoldoende goed gereageerd. Daarom krijgt u nu een andere therapie, echter wel met vergelijkbare middelen.

We noemen dit het AML 1-3-5 schema. Voor deze behandeling moet u vrij langdurig opgenomen worden, ongeveer 4-5 weken. De chemotherapie wordt in het ziekenhuis toegediend via een infuus en duurt 15 dagen. De chemotherapie vernietigt tijdelijk ook de normale beenmerg en bloedcellen. U wordt behandeld in een eenpersoons kamer en krijgt zo nodig antibiotica om infecties te vermijden en zo nodig transfusies van bloedplaatjes en rode bloedlichaampjes om het tekort aan te vullen.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:

Idarubicine	dag 1, 3 en 5 (continu, 24 uur per dag)
Cytarabine	dag 1 t/m 5 (2 maal daags gedurende 2 uur)
Cytarabine	dag 6 t/m 15 (continu, 24 uur per dag)

Daarnaast krijgt u op dag 1 t/m 5 vóór de toediening van de cytostatica ook medicijnen via het infuus toegediend om misselijkheid en braken te voorkomen.

2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt:

Metoclopramide 10 mg	zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar
----------------------	---

3. Overige medicatie:

Dexamethason 0,1 % oogdruppels dag 1 t/m 6, 3 maal daags 1 druppel in beide ogen.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakveranderingen, misselijkheid en braken
- irritatie en/of ontsteking mondslijmvlies
- vermoeidheid
- haaruitval
- invloed op de werking van het beenmerg (kan circa 3-4 weken duren)
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid
- diarree

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten

- De urine kan na toediening van Idarubicine oranje gekleurd zijn.
- Bij deze behandeling begint i.p. het haar na 2-3 weken uit te vallen
- Na toediening van Cytarabine en/of Idarubicine kunt u koorts/koude rillingen ontwikkelen
- Slijmvliesbeschadigingen van zowel mond als darmen komt frequent voor
- Huiduitslag komt regelmatig voor door toediening Cytarabine, vaak beginnend achter de oren of in lichaamspleoien (knie/elleboog)
- Verminderde werking van het hart
- De chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.
 - Cytarabine: 2 dagen

- Idarubicine: 6 dagen