

Behandelschema Nilotinib (Tasigna®) kuur bij Chronische Myeloïde Leukemie

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Nilotinib.

Nilotinib wordt gegeven wanneer Imatinib of Dasatinib (Sprycel®) onvoldoende werkzaam is geworden of indien Imatinib/Dasatinib niet wordt verdragen.

Bij chronische myeloïde leukemie wordt een aanhoudend signaal afgegeven om extra witte bloedcellen te blijven produceren. Nilotinib blokkeert die signalen heel specifiek of schakelt deze uit, zodat er geen extra witte bloedcellen worden aangemaakt. Nilotinib is een medicijn dat in tabletvorm gegeven wordt.

Het verloop van de kuur

Medicijnen die u per tablet krijgt: Nilotinib ... mg: ...maal daags ... tablet(ten)

U kunt de Nilotinib uitsluitend verkrijgen bij de Jeroen Bosch Apotheek.

Controles

Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist plaats. Afhankelijk van het verloop van de bloedcellen zal de dosis aangepast worden.

Mogelijke bijwerkingen

- soms misselijkheid en braken
- vermoeidheid
- diarree
- invloed op de werking van het beenmerg
- veranderingen van de huid/huiduitslag
- haaruitval (vaak 1-10%)

Specifieke aandachtspunten

- meldt het aan uw arts/verpleegkundigs specialist als u ooit een hepatitis B-infectie hebt gehad of nu mogelijk hebt. Dit is omdat Nilotinib er voor kan zorgen dat de hepatitis B opnieuw actief wordt en dus behandeld moet worden. Voordat met de behandeling wordt begonnen, wordt u gecontroleerd op tekenen van deze infectie.
- Tegen eventuele misselijkheid kunt u bij uw eigen apotheek of politheek medicijnen ophalen. Uw arts/verpleegkundig specialist geeft hiervoor eventueel een recept mee.
- U kunt last krijgen van vocht vasthouden (oedeem). Vaak uit zich dit in een zwelling rond de ogen, aan de enkels, benen of andere delen van het lichaam, of aan gewichtstoename in het algemeen. Dit is vrij onschuldig. Uw arts kan u eventueel een diureticum ('plaspil') voorschrijven, waardoor u meer urine produceert en dus minder vocht vasthoudt.
- Er kunnen bot- en gewrichtspijnen, in het algemeen gedurende de eerste maand. De pijn verdwijnt vaak na ongeveer twee maanden.
- Er kunnen bloedinkjes ontstaan. Dit merkt u door bijvoorbeeld een bloedneus, bloedend tandvlees, blauwe plekken die spontaan ontstaan in de huid of overmatige menstruatie.
- Huiduitslag welke meestal in de vorm van rode vlekken of jeuk kan optreden.
- Hoofdpijn en duizeligheid kunnen voorkomen.
- Droge ogen, wazig zicht, oogbindvliesontsteking kunnen voorkomen.
- Er kan koorts ontstaan
- Wees voorzichtig met autorijden of het bedienen/besturen van machines gedurende de behandeling met Nilotinib, als u duizelig bent en/of wazig ziet.
- Nilotinib blijft 7 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

U dient **direct contact** op te nemen met het ziekenhuis bij een van de volgende situaties indien:

- u koorts krijgt of er tekenen van bloedingen.

- u flauwvalt of wanneer u een onregelmatige hartslag bemerkt. Dit kan een teken zijn van een hartaandoening.
- u last krijgt van pijn of ongemak op de borst, gevoelloosheid of zwakte, problemen met lopen of met uw spraak, pijn, verkleuring of een koud gevoel in een ledemaat, omdat dit een teken kan zijn van een hart- of vaatbijwerking.
- als u plotselinge hartkloppingen, ernstige spierzwakte of verlamming, epileptische aanvallen of plotselinge veranderingen in uw denken of de mate van alertheid heeft, omdat dit een teken kan zijn van een snelle afbraak van kankercellen (ook wel tumorlyssyndroom genoemd).

Gebruiksaanwijzing

- Neem Nilotinib **NIET** in met voedsel. Neem de capsules ten minste 2 uur na voedsel in en wacht dan ten minste 1 uur voordat u weer gaat eten.
- Drink geen grapefruit-/pompelmoessap en eet geen grapefruit/pompelmoes. Het kan de hoeveelheid Nilotinib in het bloed verhogen, mogelijk tot een schadelijk niveau. Ook voedingssupplementen kunnen een negatief effect hebben op de werking van Nilotinib, zoals bijvoorbeeld Sint Jans kruid. Bespreek dan ook altijd welke medicijnen of voedingssupplementen u inneemt, ook welke u zelf bij de drogist koopt.
- Slik de capsule in zijn geheel door met een glas water
- Neem de tablet(ten) elke dag rond hetzelfde tijdstip in
- U dient met de behandelend arts te overleggen welke medicatie u gebruikt, omdat bepaalde medicijnen de werking van Nilotinib kunnen (negatief) beïnvloeden
- Als u niet in staat bent om capsules door te slikken, kunt u de inhoud van elke capsule over één theelepel appelmoes strooien. Neem dit direct in. Gebruik niet meer dan één theelepel appelmoes voor elke capsule en gebruik hiervoor geen ander voedsel dan appelmoes.

Als u een dosis vergeten bent

- verdubbel de volgende dosis niet, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- indien u braakt na inname van de tablet(ten), neem dan niet onmiddellijk opnieuw de tablet(ten) in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

Voorzorgsmaatregelen

Nilotinib valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en behoeven enkele voorzorgsmaatregelen:

- de tabletten dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven
- het breken/malen van deze tabletten is niet toegestaan
- zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de tabletten in te nemen
- na het innemen van deze tabletten wast u direct uw handen
- de verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil afgevoerd kan worden.

Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de volgende extra maatregelen:

- trek handschoenen aan voor het uitpakken van de tabletten
- geef de tabletten rechtstreeks in de mond
- handschoenen uittrekken en deze tezamen met de verpakking van de medicatie in een dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren.
- was daarna direct uw handen