

Behandelschema Ruxolitinib

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Ruxolitinib (Jakavi®)
Ruxolitinib wordt in tabletvorm gegeven.

Het verloop van de kuur

Medicijnen die u per tablet krijgt: Ruxolitinib .. mg: ... daags ... tablet(en)

Controles

Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist plaats. Afhankelijk van het verloop van de bloedcellen zal de dosis aangepast worden.

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig en zullen na enkele dagen tot enkele weken behandeling verdwijnen

- invloed op de werking van het beenmerg: bloedarmoede, bloedplaatjes te kort en infecties komen vaak voor!
- hoofdpijn en duizeligheid
- gewichtstoename

U dient ten alle tijden contact op te nemen indien u

- onverwachte blauwe plekken en/of bloedingen krijgt
- ongewone vermoeidheid, kortademigheid tijdens inspanning of in rust, een ongewoon bleke huid of veelvuldig infecties krijgt
- koorts, rillingen of andere klachten van infecties krijgt
- een aanhoudende hoest met bloedkleurig slijm uit de luchtwegen en koorts krijgt, 's nachts begint te zweten en gewicht verliest (dit kunnen tekenen van tuberculose zijn)
- een van de volgende symptomen heeft of als iemand uit uw omgeving opmerkt dat u een van deze symptomen heeft: verwardheid of moeite met denken, evenwichtsverlies of moeite met lopen, onhandigheid, moeite met spreken, verminderde sterkte of zwakte aan een kant van uw lichaam, troebel zicht en/of verlies van zicht. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige herseninfectie en uw arts kan bijkomende testen en opvolging voorstellen
- pijnlijke huiduitslag met blaren krijgt (dit zijn verschijnselen van gordelroos)

Gebruiksaanwijzing

- neem de tablet(ten) van de ochtend- en de avonddosis in volgens voorschrift van de arts
- neem de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in (met of zonder voedsel)
- slik de tablet(ten) zonder kauwen door met water
- was uw handen na inname van de tabletten
- vermijd het gebruik van grapefruitsap
- indien u medicatie gebruikt of wijzigingen optreden in uw medicijngebruik, waarschuw dan uw arts

Als u een dosis bent vergeten

- verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- indien u braakt na inname van de tablet(ten), neem dan niet onmiddellijk opnieuw de tablet(ten) in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts/verpleegkundig

specialist te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven.
Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema.

Vorzorgsmaatregelen

Ruxolitinib valt onder de groep van chemotherapeutische medicijnen en heeft enkele voorzorgsmaatregelen:

- de tablet(en) dienen buiten bereik van kinderen bewaard te blijven
- het breken van Ruxolitinib tablet is niet toegestaan
- zorg dat u voldoende drinken klaar heeft staan om de tablet(ten) in te nemen
- na het innemen van Ruxolitinib wast u direct uw handen
- de verpakking van de medicatie verzamelt u in een dubbele plastic zak, die hierna als huisvuil afgevoerd kan worden

Als uw partner/naaste u ondersteunt bij het innemen van de medicatie gelden de volgende maatregelen als extra

- trek handschoenen aan voor het uitpakken van de tablet(ten)
- geef de tablet(ten) rechtstreeks in de mond
- handschoenen uittrekken en deze tezamen met de verpakking van de medicatie in een dubbele plastic zak deponeren en als huisvuil afvoeren
- was daarna uw handen