

Agonist behandelingschema

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Datum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Echo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gonal-F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Decapeptyl | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
| Ovitrelle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Punctie | | | | | | | | | | | | | | | | |

Op de eerste dag van de menstruatie stuurt u ons een berichtje via de digitale kinderwenspoli. Dan begint u met de pil. We vertellen u wanneer u hiermee moet stoppen.

Datum Tijdstip Stopdatum pil:

.....

Bij de laatste 4 pilletjes start u met Decapeptyl injecties.

U spuit dit tussen 16.00 – 20.00 uur.

U blijft dit gebruiken tot de volgende afspraak.

.....

Uw menstruatie ná de pilstrip: dit geeft u door via de digitale kinderwenspoli. We plannen dan een echo voor u in.

.....

Op de **3e dag** van de menstruatie starten met Gonal-F injecties.

U spuit dit tussen 16.00 – 20.00 uur.

.....

Dit is stimulatiedag 1 (=SD 1), van het schema. U blijft dit gebruiken tot de volgende afspraak.

.....

Echoscopie

.....

Toediening Ovitrelle. U gebruikt deze dag géén Gonal-F en Decapeptyl® meer.

.....

Punctie. Vanaf vanavond gebruikt u 2x daags 1 capsule Utrogestan® vaginaal, gedurende 15 dagen.

.....

Evaluatiegesprek. U mag thuis een zwangerschapstest doen.