

# Het gebruik van ORGALUTRAN® (ganirelix)

## Een handleiding voor de patiënt



#### 4. Controle van de juiste positie van de naald

Trek de zuiger van de spuit voorzichtig iets op om te controleren of de naald op de juiste plaats zit. Als er bloed wordt opgezogen in de spuit betekent dit dat er een bloedvat is aangeprikt. Injecteer in dat geval geen ORGALUTRAN maar trek de naald uit de huid en druk de injectieplaats dicht met een gaasje met een desinfecterend middel; de bloeding houdt na ongeveer 2 minuten op. Gebruik de met bloed verontreinigde oplossing niet; gooi de spuit weg. Begin opnieuw met een nieuwe spuit.

#### 5. Het injecteren van de oplossing


Als de naald goed geplaatst is, druk dan de zuiger langzaam en gelijkmatig in. Hierdoor wordt de oplossing op de juiste manier ingespoten zonder dat het onderhuidse weefsel wordt beschadigd.

#### 6. Het verwijderen van de spuit

Trek de naald met een snelle beweging uit de huid en druk de injectieplaats dicht met een gaasje met een desinfecterend middel. Gebruik de voorgevulde spuit slechts eenmaal.



Vooruit in fertiliteit

 MSD Postbus 581, 2003 PC Haarlem, [www.msd.nl](http://www.msd.nl)

Lees voor gebruik de bijsluiter. Deze vindt u in de verpakking. Voor medisch-inhoudelijke vragen over dit product of het melden van bijwerkingen kunt u contact opnemen met nummer 0800 - 99 99 000 of per e-mail: [medicalinfo.nl@merck.com](mailto:medicalinfo.nl@merck.com)

NB: Dit contact vervangt niet het advies van uw arts. Vragen over algemene medische onderwerpen of uw persoonlijke medische conditie kunnen wij niet beantwoorden.

WOMN-1068311-0035 laatst gewijzigd 06-2013



In het kader van uw vruchtbaarheidsbehandeling heeft uw arts u ORGALUTRAN voorgeschreven. In deze instructiefolder leest u wat ORGALUTRAN precies is, hoe u het moet bewaren, hoe u het moet toedienen en welke mogelijke bijwerkingen u kunt verwachten. Als u vragen over ORGALUTRAN heeft, is het belangrijk dat u de bijsluiter aandachtig leest of uw arts raadpleegt.

### Wat is ORGALUTRAN en waarvoor wordt het gebruikt?

ORGALUTRAN is voorgeschreven als onderdeel van uw vruchtbaarheidsbehandeling (bijvoorbeeld IVF of ICSI). ORGALUTRAN voorkomt eventuele voortijdige pieken van het Luteïniserend Hormoon (LH).

ORGALUTRAN bevat 0,25 mg ganirelix (het actieve bestanddeel), een GnRH-antagonist, in een 0,5 ml oplossing. ORGALUTRAN wordt geleverd als steriele, kant-en-klare, gevulde spuit. ORGALUTRAN wordt onder de huid (subcutaan) toegediend.

ORGALUTRAN werkt doordat het uw natuurlijke LH-productie vermindert. Hierdoor kunnen de eitjes (follikels) in de eierstokken gestimuleerd worden tot groei, terwijl de kans op een voortijdige LH-stijging, die een negatief effect kan hebben op de resultaten van de behandeling, wordt geminimaliseerd.

### Het bewaren van ORGALUTRAN

ORGALUTRAN moet bewaard worden in de originele verpakking en beschermd tegen het zonlicht. Bewaar ORGALUTRAN bij een temperatuur van 2 tot 30 °C. Houd ORGALUTRAN buiten bereik van kinderen.

### Het gebruik van ORGALUTRAN

Uw arts zal u vertellen wanneer u met het injecteren van ORGALUTRAN moet beginnen. Vaak zal dit zijn vanaf dag 6 van de FSH-injecties. Meestal zult u ORGALUTRAN rond dezelfde tijd moeten toedienen als de FSH-injectie, maar wel op een andere plek (uw bovenbeen is een goede plaats voor ORGALUTRAN, terwijl de FSH-injecties meestal in de buik gegeven worden). U mag ORGALUTRAN en de FSH-oplossing niet vermengen.

### ORGALUTRAN-injectie vergeten


Zoals al gezegd, moet ORGALUTRAN elke dag op ongeveer dezelfde tijd toegediend worden. Als u zich realiseert dat u een injectie vergeten bent, moet u deze alsnog zo snel mogelijk toedienen. Dien echter nooit een dubbele dosis toe om de vergeten injectie te compenseren. Als u meer dan 6 uur te laat bent met het toedienen van ORGALUTRAN (dat wil zeggen meer dan 30 uur na de laatste ORGALUTRAN-injectie), dan moet u de injectie toedienen en zo snel mogelijk contact opnemen met uw behandelend arts of uw IVF-kliniek.

### Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle medicijnen kan ook ORGALUTRAN bijwerkingen hebben. Er kunnen bijvoorbeeld lokale huidklachten zoals roodheid en zwelling optreden. Deze klachten verdwijnen over het algemeen snel. Andere gemelde bijwerkingen zijn hoofdpijn en misselijkheid.


In het algemeen zijn er bijwerkingen en ongewenste effecten die gerelateerd zijn aan de vruchtbaarheidsbehandeling zelf of ten gevolge van de stimulatie van de follikels, zoals buikpijn, overstimulatie, buitenbaarmoederlijke zwangerschap of miskramen. Als u deze of andere bijwerkingen hebt, neem dan contact op met uw behandelend arts of uw IVF-kliniek.

### Stap voor stap toedienen van ORGALUTRAN




#### 1. Voorbehandeling van de injectieplaats

Was uw handen goed met water en zeep. Maak de injectieplaats schoon met een gaasje met een desinfecterend middel (bijvoorbeeld alcohol) om bacteriën van het huidoppervlak te verwijderen. Maak een gebied van ongeveer 5 centimeter rond de injectieplaats schoon en laat het desinfecterend middel minimaal 1 minuut drogen voordat u verder gaat.



#### 2. Openen van de buitenverpakking (doosje) en de plastic verpakking

Terwijl u wacht op het drogen van de alcohol kunt u de buitenverpakking (het doosje) openen en de plastic verpakking eruit halen. Haal nu de spuit voorzichtig uit de plastic verpakking. U ziet dat een naald, met een grijze beschermkap, aan de spuit bevestigd is.



#### 3. Het inbrengen van de naald

Verwijder de beschermkap van de naald. Neem een dikke huidplooi tussen duim en wijsvinger. Steek de naald in de basis van de opgenomen huidplooi onder een hoek van 45° ten opzichte van het huidoppervlak. Kies voor iedere injectie steeds een iets andere plaats.