



PATIËNTENINFORMATIE LONGZIEKTEN

Bevacizumab (=Avastin)

Hoe verloopt de behandeling

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een monoklonale antistof, namelijk bevacizumab (dit is hetzelfde als Avastin®). Bevacizumab is een monokonaal antilichaam dat specifiek de nieuwvorming van bloedvaten naar de tumor remt. Door bestraling van de hersenmetastasen kan hersenweefsel zijn afgestorven waardoor vocht rondom de hersenen ontstaat. Bevacizumab zorgt het ervoor dat het vocht rondom de hersenen afneemt. Hierdoor is de verwachting dat de neurologische klachten afnemen.

U krijgt het middel 1 keer per 3 weken via een infuus toegediend. Een periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. Uw arts zal bespreken hoeveel van deze kuren u krijgt. De meeste patiënten krijgen 4 van deze kuren. Deze behandeling kan poliklinisch gegeven worden. De behandeling duurt ongeveer 1 uur.

Een allergische reactie kan, tijdens of net na infusie optreden. Indien optredend, dan gebeurt dit voornamelijk tijdens eerste toediening. De toediening duurt ongeveer 20 minuten.

Controles

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd en heeft u een (telefonisch) gesprek met de arts of verpleegkundig specialist. Een CT-scan volgt na 2 kuren, tenzij anders besproken met uw arts.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met immuuntherapie. Meld het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar.

Bijwerkingen

De behandeling die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen en tips kunt u nalezen via onderstaande link op de website van het JBZ.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/doelgerichte-therapie

De specifieke bijwerkingen voor uw therapie zijn:

- Hoesten, kortademigheid, neusverkoudheid (>10%);
- Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, buikpijn (>10%);
- Gewrichts- en spierpijn (>10%);
- Koorts (>10%);

Contact opnemen


Via onderstaande link kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen

- Verhoogde bloeddruk (> 40%);
- Trombosevorming (>10%);
- Hoofdpijn (>10%);
- Gewichtsverlies (>10%);
- Darmperforatie en darmbloedingen (1-10%).

Bij ernstige buikpijn dient u altijd direct contact op te nemen met het ziekenhuis. U dient voorzichtig te zijn met het gebruik van ontstekingsremmers ook wel bekend als NSAID's (bijv. acetylsalicylzuur, diclofenac, ibuprofen, naproxen etc.) omdat deze het maagslijmvlies kunnen aantasten en bloedingen kunnen veroorzaken.

Kuurschema

1 	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Dag 1 Bevacizumab

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Indien u last heeft van misselijkheid mag u tot maximaal 3 keer per dag een tablet Metoclopramide van 10 mg nemen.

Wij verzoeken u bij opname, alle medicatie die u gebruikt tijdens het tijdstip van de kuur mee te brengen naar het ziekenhuis.

Medicatieoverzicht

	Dag van de kuur	1e dag na de kuur	2e dag na de kuur	3e dag na de kuur	4e dag na de kuur
Metoclopramide 10 mg (tablet)	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag