



PATIËNTENINFORMATIE LONGZIEKTEN

Cyclofosfamide Doxorubicine Vincristine (CAV-kuren)

Hoe verloopt de behandeling

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met 3 soorten cytostatica (kankerbestrijdende middel). Deze middelen zijn Cyclofosfamide (dit is hetzelfde als Endoxan®), Doxorubicine en Vincristine.

Controles

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd en heeft u een (telefonisch) gesprek met de arts of verpleegkundig specialist.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met chemotherapie. Meld het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar. Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis medicatie veranderingen door te geven zodat deze in het elektronisch dossier kunnen worden verwerkt.

Bijwerkingen

De behandeling die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen en tips kunt u nalezen via onderstaande link op de website van het JBZ.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/chemotherapie

De specifieke bijwerkingen voor uw therapie zijn:

- Vermoeidheid/zwakte (>10%);
- Misselijkheid/braken/maagklachten (>10%);
- Verminderde eetlust/smaakverandering (>10%);
- Diarree/obstipatie (moeizame ontlasting) (>10%);
- Haaruitval (>10%);
- Blaasontsteking (>10%);
- Verandering van de bloedwaarden (>10%);
- Irritatie of ontsteking van de mond/keel (1-10%);
- Overgevoeligheidsreacties, zich uitend in bijvoorbeeld; blozen, roodheid van de huid, bloeddrukdaling of stijging (1-10%);
- Huiduitslag/jeuk (1-10%);
- Benauwdheidsklachten (1-10%);
- Hartproblemen zoals een veranderd hartritme (1-10%);
- Gewrichtspijnen (1-10%);

Contact opnemen

Via onderstaande link kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen


Bij het gebruik van Doxorubicine en Vincristine zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

- Op de eerste dag van de kuur kan de urine rood gekleurd zijn door de medicijnen en in uitzonderlijke gevallen ook het traanvocht.
- Als u contactlenzen draagt raden we u aan deze de eerste 3 dagen van de kuur niet te dragen.
- Vincristine kan ernstige obstipatie veroorzaken. Het gebruik van laxans is wenselijk.
- Dexamethason kan maagklachten, verhoogde glucose spiegel, slaperigheid en opgewondenheid veroorzaken.

Veiligheid rondom cytostaticagebruik

De chemokuur die u krijgt toegediend zit nog een aantal dagen in uw lichaam. In uitscheidingsproducten, zoals urine, ontlasting en braaksel, zitten dan nog resten van de medicijnen. Wij raden aan om bij iedere kuur gedurende 7 dagen (langer is niet nodig) vanaf de eerste toediening van de chemo voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit is om andere mensen niet onnodig in contact te laten komen met chemo. Welke maatregelen specifiek genomen moeten worden kunt u lezen op eerder genoemde link van het JBZ.

Kuurschema

1 	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Dag 1

Cyclofosfamide en Doxorubicine en Vincristine

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Hieronder vindt u een medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van innemen, ter voorkoming van bijwerkingen. Op de dag van de chemokuur zelf krijgt u in het ziekenhuis nog extra medicatie ter voorkoming van bijwerkingen. Deze krijgt u via het infuus toegediend. Wij verzoeken u bij opnamen de medicatie die u gebruikt op het tijdstip tijdens de kuur mee te brengen naar het ziekenhuis.

Medicatieoverzicht

	Dag van de kuur	1e dag na de kuur	2e dag na de kuur	3e dag na de kuur
Dexamethason 4 mg (tablet)	2 tabletten, 1 uur voor de behandeling	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten
Akynzeo 300/0,5mg (capsule)	1x capsule innemen 1 uur voor de kuur	geen	geen	geen
Metoclopramide 10 mg (tablet)	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 1 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag