PATIËNTENINFORMATIE LONGZIEKTEN

Docetaxel (Taxotere®)

Hoe verloopt de behandeling

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met chemotherapie (kankerbestrijdend middel). Dit middel is Docetaxel (dit is hetzelfde als Taxotere®).

U krijgt het middel 1 keer per 3 weken via een infuus toegediend. Een periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. Uw arts zal bespreken hoeveel van deze kuren u krijgt. Deze chemotherapie wordt poliklinisch gegeven. De behandeling duurt ongeveer 1 $\frac{1}{2}$ uur.

Controles

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd en heeft u een (telefonisch) gesprek met de arts of verpleegkundig specialist.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met immunotherapie. Meld het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw arts of verpleegkundig specialist.

Bijwerkingen

De behandeling die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen en tips kunt u nalezen via onderstaande link op de website van het JBZ.
www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/chemotherapie

De specifieke bijwerkingen voor uw therapie zijn:

- Verstoorde aanmaak van de bloedcellen (>10%);
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten (>10%);
- Benauwdheid (>10%);
- Overgevoeligheidsreacties, zich uitend in rode uitslag van de huid (>10%);
- Haaruitval (>10%);
- Huiduitslag/jeuk (>10%);
- Vocht vasthouden (>10%);
- Spierpijn (>10%);
- Nagelaandoeningen (>10%);
- Smaakstoornis (>10%);
- Obstipatie (moeizame ontlasting) (1-10%).

Contact opnemen

Via onderstaande link kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.
www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen

Hoofdhuidkoeling

Het is mogelijk om bij deze chemokuur hoofdhuidkoeling toe te passen om haaruitval te voorkomen/beperken. Indien u kiest voor hoofdhuidkoeling duurt de behandeling ongeveer 1 uur langer. Meer informatie over hoofdhuidkoeling en haaruitval kunt u vinden via mijn JBZ/ Medimapp/ Over uw behandeling/ meer informatie. Tevens kunt u het wel/ niet toepassen van hoofdhuidkoeling bespreken met uw behandelaar of verpleegkundig specialist.

Veiligheid rondom cytostaticagebruik

De chemokuur die u krijgt toegediend zit nog een aantal dagen in uw lichaam. In uitscheidingsproducten, zoals urine, ontlasting en braaksel, zitten dan nog resten van de medicijnen. Wij raden aan om bij iedere kuur gedurende 4 dagen (langer is niet nodig) vanaf de eerste toediening van de chemo voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit is om andere mensen niet onnodig in contact te laten komen met chemo. Welke maatregelen specifiek genomen moeten worden kunt lezen op eerder genoemde link van het JBZ.

Kuurschema

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Dag 1 Docetaxel (Taxotere)

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie in te nemen. Hieronder vindt u een medicatieoverzicht met de medicatie en tijdstippen van innemen. Deze medicatie kunt u na het consult met de longarts of verpleegkundig specialist ophalen bij de Jeroen Bosch apotheek.
Wij verzoeken u bij opnamen de medicatie die u gebruikt op het tijdstip tijdens de kuur mee te brengen naar het ziekenhuis.

Medicatieoverzicht

	Dag van de kuur	1e dag na de kuur	2e dag na de kuur	3e dag na de kuur	4e dag na de kuur
Dexamethason 4 mg (tablet)	's ochtends 2 tabletten	geen	geen	geen	geen
Granistron 2 mg (tablet)	1 tablet, 1 uur voor de kuur	geen	geen	geen	geen
Metoclopramide 10 mg (tablet)	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag
Paracetamol 500 mg (tablet)	Bij spierpijn maximaal 4x 2 per dag				
Movicolon (macrogol/zouten)	Zonodig bij moeizame ontlasting 1-2x daags				