



## PATIËNTENINFORMATIE LONGZIEKTEN

# Carboplatine en Etoposide + radiotherapie (bestraling)

### Hoe verloopt de behandeling

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met 2 soorten chemotherapie (kankerbestrijdend middelen). Deze middelen zijn Carboplatine en Etoposide. Daarnaast start u zo spoedig mogelijk met radiotherapie. Dit wordt ook wel bestraling genoemd. Dit kan zijn vanaf de 1e dag van de behandeling of soms een paar dagen later. De radiotherapie wordt waarschijnlijk 2 keer per dag, gedurende 5 dagen per week, gegeven. Het radiotherapeutisch centrum bespreekt met u de duur van de bestraling. U krijgt op de 1e dag beide middelen via een infuus toegediend. Op dag 2 en 3 krijgt u alleen Etoposide via het infuus. Deze chemotherapie wordt poliklinisch gegeven. De behandeling op de 1e dag, wanneer u beide middelen krijgt duurt ongeveer 2,5 uur. De behandeling met alleen Etoposide duurt ongeveer 1,5 uur. Een periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. Uw arts zal bespreken hoeveel van deze kuren u krijgt.

### Controles

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd en heeft u een consult met de longarts op de polikliniek.

### Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met chemotherapie. Meld het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar.

Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis medicatie veranderingen door te geven zodat deze in het elektronisch dossier kunnen worden verwerkt.

### Bijwerkingen

De behandeling die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen en tips kunt u nalezen via onderstaande link op de website van het JBZ.

[www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/chemotherapie](http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/chemotherapie)

De specifieke bijwerkingen voor uw therapie zijn:

- Licht gehoorverlies (10%);
- Haaruitval (>10%);
- Overgevoeligheidsreactie, zich uitend bijvoorbeeld; blozen, rode uitslag van de huid (1-10%);
- Benauwdheidsklachten (1-10%);
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten(1-10%);
- Indien u bekend bent bij de trombosedienst, meldt dan daar het starten en/of stoppen van de chemokuur. Etoposide kan de werkingen van middelen, die de bloedstolling tegengaan, versterken.

### Contact opnemen


Via onderstaande link kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

[www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen](http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen)

## Veiligheid rondom cytostaticagebruik

De chemokuur die u krijgt toegediend zit nog een aantal dagen in uw lichaam. In uitscheidingsproducten, zoals urine, ontlasting en braaksel, zitten dan nog resten van de medicijnen. Wij raden aan om bij iedere kuur gedurende 5 dagen (langer is niet nodig) vanaf de eerste toediening van de chemo voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit is om andere mensen niet onnodig in contact te laten komen met chemo. Welke maatregelen specifiek genomen moeten worden kunt u lezen op eerder genoemde link van het JBZ.

## Kuurschema



**Dag 1** Carboplatine en Etoposide

**Dag 2** Etoposide

**Dag 3** Etoposide

## Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie in te nemen. Hieronder vindt u een medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van innemen. Deze medicatie kunt u na het 1e consult met de longarts ophalen bij de Jeroen Bosch apotheek. Daarna krijgt u deze medicatie mee vanuit de dagbehandeling.

Wij verzoeken u bij opname de medicatie die u gebruikt mee te brengen naar het ziekenhuis.

## Medicatieoverzicht

	Dag van de kuur	1e dag na de kuur	2e dag na de kuur	3e dag na de kuur
<b>Dexamethason 4 mg (tablet)</b>	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten	geen
<b>Granisetron á 2mg (tablet)</b>	1 tablet 1 uur voor start chemo	1 tablet 1 uur voor start chemo	1 tablet 1 uur voor start chemo	geen
<b>Metoclopramide 10mg (tablet)</b>	Zo nodig bij misselijkheid 3x daags 1	Zo nodig bij misselijkheid 3x daags 1	Zo nodig bij misselijkheid 3x daags 1	Zo nodig bij misselijkheid 3x daags 1