



PATIËNTENINFORMATIE LONGZIEKTEN

Cisplatine en Etoposide

Hoe verloopt de behandeling

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met chemotherapie (kankerbestrijdend middelen). Deze middelen zijn Cisplatine en Etoposide. U krijgt op de 1 e dag beide middelen via een infuus toegediend. U verblijft hiervoor ongeveer 7 uur in het ziekenhuis. Op dag 2 en 3 krijgt u alleen Etoposide via het infuus en mag u tussendoor naar huis. De behandeling met Etoposide zal ongeveer 1,5 uur duren. De periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. In principe krijgt u 4 kuren chemotherapie. Mocht dit anders zijn dan bespreekt de arts dit met u.

Controles

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd en heeft u een (telefonisch) gesprek met de arts of verpleegkundig specialist.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met chemotherapie. Meld het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar.

Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis medicatie veranderingen door te geven zodat deze in het elektronisch dossier kunnen worden verwerkt.

Bijwerkingen

De behandeling die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen en tips kunt u nalezen via onderstaande link op de website van het JBZ.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/chemotherapie

De specifieke bijwerkingen voor uw therapie zijn:

- Overgevoeligheidsreacties, zich uitend in bijvoorbeeld; blozen, roodheid van de huid, bloeddrukval of stijging; (1-10%)
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten; (1-10%)
- Haaruitval; (meer dan 10%)
- Tuitende oren/gehoorverlies; (meer dan 10%).
- Opgewondenheid;

Indien u bekend bent bij de trombose dienst, meldt dan daar het starten en/of stoppen van Etoposide. Etoposide kan de werkingen van middelen, die de bloedstolling tegengaan versterken.

Contact opnemen


Via onderstaande link kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen

Veiligheid rondom cytostaticagebruik

De chemokuur die u krijgt toegediend zit nog een aantal dagen in uw lichaam. In uitscheidingsproducten, zoals urine, ontlasting en braaksel, zitten dan nog resten van de medicijnen. Wij raden aan om bij iedere kuur gedurende 7 dagen (langer is niet nodig) vanaf de eerste toediening van de chemo voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit is om andere mensen niet onnodig in contact te laten komen met chemo. Welke maatregelen specifiek genomen moeten worden kunt u lezen op eerder genoemde link van het JBZ.

Kuurschema



Dag 1 Cisplatine en Etoposide

Dag 2 Etoposide

Dag 3 Etoposide

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie in te nemen. Hieronder vindt u een medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van innemen. Deze medicatie kunt u na het consult met de longarts of verpleegkundig specialist ophalen bij de Jeroen Bosch apotheek.

Op de dag van de chemokuur krijgt u in het ziekenhuis medicatie toegediend ook ter voorkoming van bijwerkingen.

Wij verzoeken u bij opnamen de medicatie die u gebruikt op het tijdstip tijdens de kuur mee te brengen naar het ziekenhuis.

Medicatieoverzicht

	1e dag van de kuur	2e dag van de kuur	3e dag van de kuur	4e dag van de kuur	5e dag van de kuur
Dexamethason 4 mg (tablet)	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten	geen
Granistron 2 mg (tablet)	1 tablet 1 uur voor start chemo	1 tablet 1 uur voor start chemo	1 tablet 1 uur voor start chemo	geen	geen
Metoclopramide 10 mg (tablet)	geen	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag