



PATIËNTENINFORMATIE LONGZIEKTEN

Pembrolizumab (Keytruda®), Alimta® (Pemetrexed) en Cisplatin

Hoe verloopt de behandeling

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een gecombineerde behandeling met chemotherapie (dit zijn Alimta en Cisplatin) en immuuntherapie (dit is Pembrolizumab).

U krijgt deze middelen 1 keer in de drie weken via een infuus toegediend en duurt ongeveer 7 uur.

Drie weken later krijgt u het middel opnieuw. Een periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. In principe krijgt u 4 kuren en hierna krijgt u een onderhoudsbehandeling met Alimta en Pembrolizumab. De duur van de behandeling is maximaal 1 jaar.

Controles

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd en heeft u een (telefonisch) gesprek met de arts of verpleegkundig specialist.

Medicatie

Bepaalde medicatie zoals pijnstillers (bijvoorbeeld Diclofenac, Naproxen, Brufen) en bloedverdunners (o.a. Ascal, Aspirine), voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamines gaan niet samen met chemotherapie. Als u deze pijnstillers gebruikt bespreekt u met de longarts of verpleegkundig specialist hoelang u moet stoppen rondom de kuur. Wij verzoeken u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis medicatieveranderingen door te geven zodat deze in het elektronisch dossier kunnen worden verwerkt.

Bijwerkingen

De behandeling die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen en tips kunt u nalezen via onderstaande linken op de website van het JBZ

www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/chemotherapie

www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/immuuntherapie

De specifieke bijwerkingen voor uw therapie zijn:

- Overgevoeligheidsreacties, zich uitend in rode uitslag van de huid/jeuk (>10%);
- Vermoeidheid (>10%);
- Diarree/buikpijn/verandering stoelgang (>10%);
- Misselijkheid, maagpijn en afname eetlust (>10%);
- Droge, gevoelige mond en keel (>10%);
- Tuitende oren/gehoorverlies (>10%);
- Koorts (>10%);
- Benauwdheidsklachten, hoesten (1-10%);
- Gewrichtspijn/stijfheid (1-10%);

Contact opnemen

Via onderstaande link kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.


www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen

- Griepachtige verschijnselen (1-10%);
- Droge gevoelige ogen en toename traanafscheiding (1-10%);
- Duizeligheid en hoofdpijn (1-10%);
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten (1-10%);
- Ritmestoornissen van het hart (1-10%);
- Haaruitval (0,1-1%);

Veiligheid rondom cytostaticagebruik

De chemokuur die u krijgt toegediend zit nog een aantal dagen in uw lichaam. In uitscheidingsproducten, zoals urine, ontlasting en braaksel, zitten dan nog resten van de medicijnen. Wij raden aan om bij iedere kuur gedurende 7 dagen (langer is niet nodig) vanaf de eerste toediening van de chemo voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit is om andere mensen niet onnodig in contact te laten komen met chemo. Welke maatregelen specifiek genomen moeten worden kunt u lezen op eerder genoemde link van het JBZ.

Kuurschema

1 	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Dag 1

Pembrolizumab,
Alimta en Cisplatine

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

In onderstaand schema vindt u een medicatieoverzicht met hierop de medicatie en tijdstippen van innemen, ter voorkoming van bijwerkingen. Op de dag van de chemokuur zelf krijgt u in het ziekenhuis nog extra medicatie ter voorkoming van bijwerkingen. Wij verzoeken u bij opnamen de medicatie die u gebruikt op het tijdstip tijdens de kuur mee te brengen naar het ziekenhuis.

	Dag voor de kuur	Dag van de kuur	1e dag na de kuur	2e dag na de kuur	3e dag na de kuur
Dexamethason 4 mg (tablet)	's ochtends 2 tabletten innemen	's ochtends 2 tabletten innemen	's ochtends 2 tabletten innemen	's ochtends 2 tabletten innemen	geen
Akynzeo 1 malig (capsule)	geen	1 tablet, 1 uur voor de paclitaxel in zkh innemen	geen	geen	geen
Metoclopramide 10 mg (tablet)	geen	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag
Foliumzuur 0,5 mg (tablet)	Dagelijks 1 tablet; starten 1 op dag 1 van de 1e chemokuur, stop 3 weken na de laatste Alimta®/Carboplatin chemokuur				
Vitamine B12 (injectie)	Één keer per 9 weken een injectie; starten op dag 1 van de 1e chemokuur, stop 3 weken na laatste Alimta®/Carboplatin chemokuur				