



PATIËNTENINFORMATIE LONGZIEKTEN

## Paclitaxel / Carboplatin / Pembrolizumab

### Verloop chemokuur

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met immunotherapie (Pembrolizumab) en chemotherapie (Paclitaxel en Carboplatin).

U krijgt deze middelen 1 keer per 3 weken via een infuus toegediend. De periode van 3 weken wordt een kuur genoemd. Deze behandeling kan poliklinisch gegeven worden. De behandeling duurt ongeveer 6 uur. In principe krijgt u 4 van deze kuren. Na deze kuren wordt mogelijk doorgedaan met een onderhoudsbehandeling. Een onderhoudsbehandeling betekent dat u gedurende maximaal ongeveer 2 jaar iedere 3 weken een behandeling met immunotherapie (Pembrolizumab) krijgt.

### Controles

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd en heeft u een (telefonisch) gesprek met de arts of verpleegkundig specialist.

### Bijwerkingen

De behandeling die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen en tips kunt u nalezen via onderstaande linken op de website van het JBZ

[www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/chemotherapie](http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/chemotherapie)

[www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/immuuntherapie](http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/immuuntherapie)

De specifieke bijwerkingen voor uw behandeling zijn:

- Overgevoeligheidsreacties, zich uitend in bijvoorbeeld; blozen, roodheid van de huid, bloeddrukdaling of stijging (> 34%);
- Benauwdheidsklachten, hoesten 1- 10%;
- Huiduitslag >10%;
- Griepachtige verschijnselen 1-10%;
- Verminderde eetlust 1-10%;
- Diarree/buikpijn >10%
- Spierpijn/Gewrichtspijn (>10%);
- Haaruitval (>10%);
- Prikkelend/doof/brandend gevoel handen/voeten (>10%);
- Gehoorverlies m.n. van de hoge tonen, oorsuizen (>10%);
- Nagelafwijkingen (>1-10%);

### Contact opnemen

Via onderstaande link kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

[www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen](http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen)

## Veiligheid rondom cytostaticagebruik

De chemokuur die u krijgt toegediend zit nog een aantal dagen in uw lichaam. In uitscheidingsproducten, zoals urine, ontlasting en braaksel, zitten dan nog resten van de medicijnen. Wij raden aan om bij iedere kuur gedurende 4 dagen (langer is niet nodig) vanaf de eerste toediening van de chemo voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit is om andere mensen niet onnodig in contact te laten komen met chemo. Welke maatregelen specifiek genomen moeten worden kunt u lezen op eerder genoemde link van het JBZ.

## Kuurschema

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Dag 1

Paclitaxel / Carboplatin/  
Pembrolizumab

## Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Ter voorkoming van bijwerkingen dient u medicatie in te nemen. Hieronder vindt u een medicatieoverzicht met de medicatie en tijdstippen van innemen. Deze medicatie kunt u na het consult met de longarts of verpleegkundig specialist ophalen bij de Jeroen Bosch apotheek.

Wij verzoeken u bij opnamen de medicatie die u gebruikt op het tijdstip tijdens de kuur mee te brengen naar het ziekenhuis.

De medicatie waarbij het begrip 'zo nodig' staat adviseren wij om in te nemen als u klachten heeft van misselijkheid. Mocht u geen klachten hebben dan raden wij u aan deze medicatie ook niet te nemen.

## Medicatieoverzicht

	Dag van de kuur	1e dag na de kuur	2e dag na de kuur	3e dag na de kuur
<b>Dexamethason 4 mg (tablet)</b>	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten	's ochtends 2 tabletten	geen
<b>Granisteron 2 mg (tablet)</b>	1 tablet, 1 uur voor de paclitaxel in ziekenhuis	geen	geen	geen
<b>Levocetirizine 5 mg (tablet)</b>	1 tablet, 1 uur voor de paclitaxel in ziekenhuis	geen	geen	geen
<b>Metoclopramide 10 mg (tablet)</b>	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag