

## **Behandelschema: Chemoradiatie (Cisplatine en radiotherapie) bij baarmoederhalskanker**

Uw arts heeft u voorgesteld om u te behandelen met chemoradiatie: dat is radiotherapie in combinatie met chemotherapie (celgroeiremmende middelen). De chemotherapiebehandeling die u is voorgesteld heet de Cisplatine kuur. De kuur wordt eenmaal per week gegeven en zal poliklinisch plaatsvinden. In principe krijgt u vijf kuren. Mocht het anders zijn dan zal de arts dat met u bespreken.

### **Het verloop van de kuur**

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:

Cisplatine: dag 1 - 8 - 15 - 22 en 29, dus 5 keer in totaal

Vóór en na de toediening van de cytostatica krijgt u vocht via het infuus toegediend om de nieren te beschermen.

We gaan u bij start en op het einde wegen, mocht u te veel vocht vasthouden of klachten daarvan hebben gaat u zonodig plasmedicatie krijgen (Furosemide).

De behandeling duurt ongeveer 5 en half uur.

2. Radiotherapie: 5 weken, elke werkdag. De radiotherapie start op dag 1 van de chemotherapie, waarbij u eerst radiotherapie krijgt en daarna de chemotherapie.

3. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt (dit zijn medicijnen om misselijkheid en braken te voorkomen):

Dexamethason 8mg dag 1, 1 uur vóór de start van de behandeling innemen

Akynzeo 300/0.5mg dag 1, 1 uur vóór de start van de behandeling innemen

Dexamethason 8 mg dag 2 t/m 4 ('s ochtends, niet op lege maag innemen) 1x daags

Metoclopramide 10 mg zo nodig 1-3 x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

Dalteparine 5000 IE sc. 1 x daags een spuitje in de huid. Start op dag 1 t/m 4 weken na de laatste bestraling.

### **Controles**

Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur

Controle arts/ VS: vóór start nieuwe kuur.

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de mogelijkheid dat de kuur wordt uitgesteld.

### **Algemene bijwerkingen**

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- haaruitval (zelden leidend tot kaalheid)
- invloed op de bloedcellen
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid
- verandering van ontlastingspatroon

### **Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten**

- soms treden gehoorstoornissen op. Als u hier last van heeft, bespreek het dan met uw arts.
- perifere neuropathie. U kunt klachten krijgen van een dof, dood gevoel in vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit wordt veroorzaakt door een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg, maar het kan zo zijn dat de klachten naarmate u meer kuren krijgt, op de voorgrond komen te staan. Soms zijn deze klachten dan continue aanwezig. U dient dit altijd te melden bij een volgend polibezoek. Preventief kan er niets aan deze bijwerking gedaan worden, maar verergering zal voorkomen moeten worden door eventuele aanpassing van de dosering van de kuur.
- gebruik van NSAID's in combinatie met cisplatine wordt sterk ontraden. Eventueel gebruik altijd in overleg met behandelend arts
- de anticonceptiepil heeft een verminderde werking door het gebruik van Akynzeo. Tot 1 maanden na het gebruik is daarom aanvullende bescherming nodig.
- Visolie capsules heeft mogelijk een negatief effect op de werking van deze chemotherapie. Daarom is het advies om deze 24 uur voor tot 24 uur na het ontvangen van de chemotherapie niet in te nemen.
- Plaatselijke bijwerkingen van radiotherapie kunnen zijn irritatie/ beschadiging van de huid. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Verbeeten Instituut.

### **Specifieke aandachtspunten dexamethason**

- kan de eetlust verhogen
- kan stemmingswisselingen geven
- kan een rode 'blos' op het gelaat geven
- kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen
- kan vocht in het lichaam vasthouden
- soms hebben mensen ten gevolge van dexamethason wat moeite met inslapen
- na het stoppen van de dexamethason kunt u zich wat lusteloos voelen

### **Excreta**

- de chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.  
O      Cisplatin: 7 dagen