

## Behandelschema: T3Ca kuren (Paclitaxel / Carboplatine)

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). Cytostatica wordt ook wel chemotherapie genoemd. De behandeling die u is voorgesteld heet de T3Ca-kuur en bestaat uit twee verschillende stoffen chemotherapie: Paclitaxel en Carboplatine.

U krijgt deze medicijnen via het infuus toegediend. De kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven. U krijgt in totaal 6 kuren. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Deze chemotherapie kan poliklinisch gegeven worden.

### Het verloop van de kuur

#### 1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:

Paclitaxel: dag 1  
Carboplatine: dag 1

#### 2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt:

Dexamethason 8 mg dag 1, één uur voor start van de behandeling innemen  
dag 2+3: in de ochtend  
Granisetron 2 mg dag 1, één uur voor start van de behandeling innemen  
Clemastine 2 mg dag 1, één uur voor start van de behandeling innemen  
Metoclopramide 10 mg zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen  
achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen  
met uw behandelaar.

De totale behandeling duurt ongeveer 3 uur.

### Controles

Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur  
Controle bij uw arts/verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe kuur  
Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de  
mogelijkheid dat de volgende kuur een week wordt uitgesteld.

### Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- haaruitval
- invloed op de bloedcellen
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid
- verandering van ontlastingspatroon

### Specifieke aandachtspunten

- overgevoeligheidsreacties kunnen optreden tijdens de toediening van zowel Paclitaxel als Carboplatin. U krijgt op de dag van de opname en toediening medicijnen om dit te voorkomen. Reacties kunnen zijn: blozen, roodheid van de huid, jeuk, beklemmend gevoel op de borst, stekende pijn in de onderrug en koorts. Indien u deze klachten krijgt moet u ze direct aan de verpleegkundige melden.

- Vooraf neemt u Clemastine in. Van dit middel kunt u slaperig worden, daarom wordt afgeraden om binnen 24 uur na het infuus te gaan autorijden
- spierpijn, gewrichtspijn: dit kan optreden 2 à 3 dagen na het infuus en verdwijnt weer. Deze pijn kan bestreden worden met Paracetamol 500 mg.
- perifere neuropathie. U kunt klachten krijgen van een dof, dood gevoel in vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit wordt veroorzaakt door een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg, maar het kan zo zijn dat de klachten naarmate u meer kuren krijgt, op de voorgrond komen te staan. Soms zijn deze klachten dan continue aanwezig. U dient dit altijd te melden bij een volgend polibezoek. Preventief kan er niets aan deze bijwerking gedaan worden, maar verergering zal voorkomen moeten worden door eventuele aanpassing van de dosering van de kuur.
- bij deze behandeling begint uw haar  $\pm$  14 dagen na de eerste kuur uit te vallen.
- Het is bij deze behandeling mogelijk om hoofdhuikdoeling toe te passen. Bij 31% van de patiënten die bij wie tijdens deze kuur hoofdhuikdoeling werd toegepast was geen andere vorm van hoofdbedekking nodig. 69% van de patiënten waren ondanks hoofdhuikdoeling afhankelijk van een haarwerk/mutsjes/sjaals/etc. Indien u kiest voor hoofdhuikdoeling duurt de behandeling per keer 2 uur langer. De totale behandeling duurt dan ongeveer 7 uur.
- soms treden gehoorstoornissen op.
- Visolie capsules heeft mogelijk een negatief effect op de werking van deze chemotherapie. Daarom is het advies om deze 24 uur voor tot 24 uur na het ontvangen van de chemotherapie niet in te nemen.

#### **Specifieke aandachtspunten dexamethason**

- kan de eetlust verhogen
- kan stemmingswisselingen geven
- kan een rode 'blos' op het gelaat geven
- kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen
- kan vocht in het lichaam vasthouden
- soms hebben mensen ten gevolge van dexamethason wat moeite met inslapen
- na het stoppen van de dexamethason kunt u zich wat lusteloos voelen

#### **Excreta**

De chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

- o Paclitaxel: 2 dagen
- o Carboplatin: 4 dagen