

Behandelschema: Bevacizumab - Gemcitabine - Carboplatine kuren bij eierstokkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). U krijgt drie verschillende stoffen toegediend: Gemcitabine - Carboplatine zijn beiden cytostatica, Bevacizumab is een monoklonaal antilichaam dat specifiek de nieuwvorming van bloedvaten naar de tumor remt.

In principe krijgt u 6 kuren. In overleg met uw arts kan dit uitgebreid worden tot maximaal 10 kuren. Dit is afhankelijk van het effect en de verdraagzaamheid. De kuren worden één keer per drie weken (21 dagen) gegeven. U krijgt op de 1^e en 8^e dag medicijnen via het infuus. De toediening van deze behandeling vindt op de polikliniek plaats.

Het verloop van de kuur:

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:

Bevacizumab: dag 1
Gemcitabine: dag 1 en 8
Carboplatine: dag 1

Daarnaast moet u een uur vóór de toediening van de chemotherapie op dag 1 en dag 8 medicatie innemen om misselijkheid en braken te voorkomen.

2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt:

Granisteron 2mg dag 1 en dag 8, 1 uur voor de chemotherapie innemen.
Dexamethason 8 mg dag 1 (ochtend, niet op lege maag innemen), 1 uur voor de chemotherapie innemen. Dit zijn 2 tabletten van 4 mg.
Dexamethason 8 mg dag 2 en 3 (ochtend, niet op lege maag innemen). Dit zijn 2 tabletten van 4 mg.
Metoclopramide 10 mg Zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

De behandeling duurt op dag 1: ± 3 uur en dag 8: ± 1 uur.

Controles

Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur
Controle van eiwit in urine: vóór start nieuwe kuur
Controle bij uw arts/verpleegkundig specialist: vóór start nieuwe kuur

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de mogelijkheid dat de volgende kuur een week wordt uitgesteld.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- invloed op de bloedcellen
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid
- verandering van het ontlastingspatroon

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Gemcitabine en Carboplatin

- een allergische reactie kan optreden tijdens het infuus Carboplatin. Reacties kunnen zijn: blozen, roodheid van de huid, jeuk, spierpijn, beklemmend gevoel op de borst, stekende pijn in de onderrug en koorts. Indien u deze klachten krijgt moet u ze direct melden aan de verpleegkundige.
- soms treden gehoorstoornissen op
- perifere neuropathie. U kunt klachten krijgen van een dof, dood gevoel in vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit wordt veroorzaakt door een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg, maar het kan zo zijn dat de klachten naarmate u meer kuren krijgt, op de voorgrond komen te staan. Soms zijn deze klachten dan continue aanwezig. U dient dit altijd te melden bij een volgend polibezoek. Preventief kan er niets aan deze bijwerking gedaan worden, maar verergering zal voorkomen moeten worden door eventuele aanpassing van de dosering van de kuur.
- soms wat griepachtige verschijnselen of koorts op de dag van het infuus (zowel dag 1 als dag 8), hiervoor mag zo nodig paracetamol genomen worden.
- Visolie capsules heeft mogelijk een negatief effect op de werking van deze chemotherapie. Daarom is het advies om deze 24 uur voor tot 24 uur na het ontvangen van de chemotherapie niet in te nemen.
- soms wat huiduitslag of jeuk

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten Bevacizumab

- een allergische reactie kan, tijdens of net na infusie optreden. Indien optredend, dan gebeurt dit voornamelijk tijdens eerste toediening. De 1e toediening vindt daarom in 90 minuten plaats, indien geen problemen de 2e in 60 minuten en vanaf 3e toediening in 30 minuten. Vooraf en na toediening meet de verpleegkundige altijd uw hartslag, bloeddruk, temperatuur en ademhaling.
- verhoogde bloeddruk kan optreden. Controle van bloeddruk en urine vindt plaats gedurende de behandeling met Bevacizumab.
- complicaties bij wondgenezing. Behandeling met Bevacizumab mag niet binnen 28 dagen na een ingrijpende operatie of totdat de wond geheel genezen is. Bij problemen met wondgenezing moet u altijd contact op nemen met het ziekenhuis.
- trombosevorming
- bloedingen (neus, tandvlees, vaginaal)
- darmperforatie en darmbloedingen (zeer zelden). Bij ernstige buikpijn dient u altijd direct contact op te nemen met het ziekenhuis.
- u dient voorzichtig te zijn met het gebruik van ontstekingsremmers zoals Acetylsalicylzuur (bijv. Aspirine[®], Diclofenac, Brufen, Naprosyne etc.) omdat deze het maagslijmvlies kunnen aantasten en bloedingen kunnen veroorzaken.

Specifieke aandachtspunten dexamethason

- kan de eetlust verhogen
- kan stemmingswisselingen geven
- kan een rode 'blos' op het gelaat geven
- kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen
- kan vocht in het lichaam vasthouden
- soms hebben mensen ten gevolge van dexamethason wat moeite met inslapen
- na het stoppen van de dexamethason kunt u zich wat lusteloos voelen

Excreta

De chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

- o Gemcitabine: 2 dagen
- o Carboplatine: 4 dagen