

## **Behandelschema: Carboplatin / Doxorubicine Liposomaal (Cealyx) kuren bij eierstokkanker**

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie. Het cytostatica (celgroeiremmend middelen) dat u gaat krijgen, zijn Carboplatin en Doxorubicine Liposomaal. Deze kuur wordt eenmaal per 4 weken gegeven. Afhankelijk van de respons en verdraagzaamheid wordt het aantal kuren bepaald. De kuur kan poliklinisch gegeven worden.

### **Het verloop van de kuur**

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:

Doxorubicine Liposomaal: dag 1

Carboplatin: dag 1

Daarnaast moet u 1 uur vóór de toediening van de cytostatica op dag 1 medicijnen innemen om misselijkheid en braken te voorkomen.

2. Medicijnen tegen de misselijkheid die u in tabletvorm krijgt:

Granisetron 2mg dag 1, 1 uur vóór de toediening van de chemotherapie innemen.

Dexamethason 8 mg dag 1, 1 uur vóór de toediening van de chemotherapie innemen. Dit zijn 2 tabletten van 4 mg

Dexamethason 8 mg dag 2 en 3, 1x daags ('s ochtends, niet op lege maag innemen). Dit zijn 2 tabletten van 4 mg

Metoclopramide 10 mg dag 1 t/m 5, zo nodig 1- 3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

De eerste behandeling duurt ± 3 uur, de behandelingen hierna duren ± 2 uur.

### **Controles**

Controle van uw bloed: vóór start nieuwe kuur

Controle arts/ VS: vóór start nieuwe kuur

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de mogelijkheid dat de kuur één week wordt uitgesteld.

### **Algemene bijwerkingen**

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijk en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- haaruitval (zelden)
- invloed op de bloedcellen
- invloed op menstruatie /vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid
- verandering van ontlastingspatroon

### **Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten**

- op de eerste dag kan de urine rood gekleurd zijn van de medicijnen
- allergische reactie tijdens het infuus (blozen, kortademigheid, drukkend gevoel op borst/in keel, stekende pijn in de onderrug, licht in het hoofd, hoofdpijn, rillerigheid, opgezwollen gezicht). Als u een allergische reactie krijgt moet u dit direct melden aan de verpleegkundige. Er zullen dan medicijnen via het infuus gegeven worden om de allergische reactie op te heffen.

- soms klachten van een onregelmatige hartslag of kortademigheid. Indien dit optreedt, dient u contact op te nemen met het ziekenhuis.
- hand-voet-syndroom, de meest voorkomende symptomen zijn: roodheid, jeuk, pijn of gevoeligheid, zwelling en schilferen of vervellen van de huid.
- neuropathie; dit is een stoornis van de zenuwen. U ervaart dit als prikkelen, branden of “doofheid” van handen en/of voeten. Dit verdwijnt meestal weer na de behandeling. Als u hier last van heeft, bespreek het dan tijdens uw eerstvolgend polibezoek.
- Visolie capsules heeft mogelijk een negatief effect op de werking van deze chemotherapie. Daarom is het advies om deze 24 uur voor tot 24 uur na het ontvangen van de chemotherapie niet in te nemen.

#### **Adviezen om het hand-voet-syndroom te voorkomen en/of te beperken:**

- dompel uw handen en/of voeten zo mogelijk in een bad met koud water
- neem in de zomer regelmatig een koel bad
- vermijd hete lange douches; neem korte lauwe douches
- vermijd direct zonlicht; verblijf zoveel mogelijk in de schaduw
- vermijd nauw zittend schoeisel of schoenen met hoge hakken
- vermijd het dragen van knellende kleding (geen strakke broeken, riemen, BH's, handschoenen en sokken)
- vermijd het dragen van knellende ringen, armbanden, horloges etc
- vermijd intensieve inspanningen die een wondje / letsel aan de handen of voeten kunnen veroorzaken (tuinieren / joggen)
- vermijd blootstelling van de huid aan zeer heet water (bijv. de afwas)
- smeer handen en voeten regelmatig in met vaseline of uierzalf, om uitdrogen te voorkomen

#### **Specifieke aandachtspunten dexamethason**

- kan de eetlust verhogen
- kan stemmingswisselingen geven
- kan een rode 'blos' op het gelaat geven
- kan bij aanleg voor suikerziekte de bloedsuikers (tijdelijk) verhogen
- kan vocht in het lichaam vasthouden
- soms hebben mensen ten gevolge van dexamethason wat moeite met inslapen
- na het stoppen van de dexamethason kunt u zich wat lusteloos voelen

#### **Excreta:**

De chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.

- o Carboplatine: 4 dagen
- o Doxorubine: 6 dagen