

Behandelschema: Gemcitabine bij eierstokkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie. De behandeling bestaat uit chemotherapie (celgroeiremmende middelen): Gemcitabine. De kuur duurt in totaal vier weken (=28 dagen) en bestaat uit een infuus op dag 1, 8 en 15. Daarna heeft u één week rust. Het aantal kuren wordt in overleg met de arts en u bepaald. Deze kuur kan poliklinisch gegeven worden.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:

Gemcitabine: dag 1, 8 en 15

Daarnaast moet u een uur vóór de toediening van de cytostatica medicijnen innemen om misselijkheid en braken te voorkomen.

2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt:

Granisetron 2mg dag 1, 8 en 15, 1 uur vóór de chemotherapie innemen.

Metoclopramide 10 mg Zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

De behandeling duurt ± 1 uur.

Controles

Controle bloed: vóór start nieuwe kuur en zo nodig elke week

Controle arts/ VS: vóór start nieuwe kuur.

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hersteld hebben, bestaat de mogelijkheid dat de kuur een week wordt uitgesteld.

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, smaakverandering, soms misselijkheid en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- vermoeidheid
- invloed op de bloedcellen
- invloed op menstruatie/vruchtbaarheid
- invloed op seksualiteit
- veranderingen van de huid
- verandering van het ontlastingspatroon

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten

- soms wat griepachtige verschijnselen, hiervoor mag u zo nodig paracetamol innemen
- soms wat huiduitslag of jeuk
- Gemcitabine blijft 2 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.