

Behandelschema: PARP-remmer Olaparib

Uw arts heeft u voorgesteld te starten met de aanvullende therapie (ook wel doelgerichte therapie) Olaparib. Olaparib remt de werking van het eiwit PARP, dat normaal zorgt voor herstel van de kankercel. Olaparib blokkeert de werking van het PARP-eiwit, waardoor de kankercel minder goed schade kan herstellen en stoppen met groeien.

Bij deze behandeling neemt u dagelijks Olaparib in. In principe blijft u doorgaan met de behandeling zolang u de medicatie kan verdragen en er geen sprake is van groei van de tumor.

Het verloop van de behandeling

1. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt:

Olaparib tabletten 150mg	2x daags 2 tabletten
Metoclopramide 10mg	zo nodig 1-3x daags, maximaal 5 dagen achtereen gebruiken.

Controles

Controle van uw bloed: elke 4 weken

Controle arts/verpleegkundig specialist: elke 4 weken

Algemene bijwerkingen

- verminderde eetlust, soms misselijk en braken
- vermoeidheid
- duizeligheid
- hoofdpijn
- diarree
- invloed op de bloedcellen

Gebruiksaanwijzing Olaparib

- neem de tabletten in volgens voorschrift van de arts
- u hoeft geen rekening te houden met de maaltijd
- slik de tabletten zonder kauwen door met water
- gedurende 7 dagen vóór het starten met Olaparib en tijdens het gebruik van Olaparib mag u **GEEN** Sevilla sinaasappelen, pompelmoes, pompelmoessap, grapefruit en grapefruitsap gebruiken.

Als u een dosis bent vergeten

- verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts.
- indien u braakt na inname van de tabletten, neem dan niet onmiddellijk opnieuw tabletten in. U wordt verzocht het braken aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist te melden, zodat zij u medicatie tegen de misselijkheid kunnen voorschrijven. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema

Specifieke aandachtspunten

- bespreek elke verandering in uw geneesmiddelgebruik eerst met de verpleegkundig specialist of behandelend arts. Dit geldt ook voor homeopathische middelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de drogist. Sommige middelen mogen namelijk niet in combinatie met Olaparib gebruikt worden.