



PATIËNTENINFORMATIE LONGZIEKTEN

Hycamtin (=Topotecan) (tabletvorm)

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdend middel). Dit middel is Hycamtin® (dit is hetzelfde als Topotecan).

Deze chemotherapie kan zowel via een infuus of via capsules worden toegediend. Uw arts heeft besloten u capsules voor te schrijven. U neemt deze gedurende vijf achtereenvolgende dagen in tijdens een periode van 3 weken. De periode van 3 weken wordt een kuur genoemd.

Controles

Kort voor de volgende kuur komt u voor controle naar het ziekenhuis en wordt onder andere uw bloed gecontroleerd en heeft u een (telefonisch) gesprek met de arts of verpleegkundig specialist.

Medicatie

Bepaalde medicatie, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamines gaan niet samen met chemotherapie tabletten. Meld het gebruik of wijzigingen hiervan altijd bij uw behandelaar.

Bijwerkingen

De behandeling die u krijgt geven mogelijk bijwerkingen. De algemene bijwerkingen en tips kunt u nalezen via onderstaande link op de website van het JBZ.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/chemotherapie

De specifieke bijwerkingen voor uw behandeling zijn:

- Vermoeidheid/zwakte (>10%);
- Misselijkheid/braken/maagklachten (>10%);
- Verminderde eetlust/smaakverandering (>10%);
- Diarree/obstipatie (moeizame ontlasting); (>10%);
- Buikpijn (>10%);
- Gedeeltelijke haaruitval (>10%);
- Irritatie of ontsteking van de mond/keel (>10%);
- Huiduitslag/jeuk (>10%);

Contact opnemen

Via onderstaande link kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met het ziekenhuis.

www.jeroenboschziekenhuis.nl/wanneer-moet-u-contact-opnemen

Bij het gebruik van Hycamtin® capsules zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

- Bewaar de capsules Hycamtin® in de koelkast (niet in de vriezer);
- Was na inname direct uw handen;
- Neem de capsules heel in (niet bijten, breken of open maken);
- Het aantal capsules wat moet worden ingenomen is per patiënt anders;
- Neem de capsules direct achter elkaar in, evt met wat drinken en eten;
- De lege doordrukstrips in dubbele stevige afvalzakken doen en afvoeren met het normale huisvuil.

Kuurschema

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Dag 1 Hycamtin capsules

Dag 2 Hycamtin capsules

Dag 3 Hycamtin capsules

Dag 4 Hycamtin capsules

Dag 5 Hycamtin capsules

Medicatie om bijwerkingen te voorkomen

Indien u last heeft van misselijkheid mag u tot maximaal 3 keer per dag een tablet Metoclopramide van 10 mg nemen.

Wij verzoeken u bij opname, alle medicatie die u gebruikt tijdens het tijdstip van de kuur mee te brengen naar het ziekenhuis.

Medicatieoverzicht

	Dag van de kuur	1e dag na de kuur	2e dag na de kuur	3e dag na de kuur	4e dag na de kuur
Metoclopramide 10 mg (tablet)	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag	Zo nodig maximaal 3 per dag