

Behandelschema: Palbociclib en Fulvestrant bij lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Palbociclib en Fulvestrant.

Palbociclib is een geneesmiddel dat een specifiek eiwit remt binnen in de cel (intracellulair). Hierdoor wordt de celcyclus in borstkankercellen geremd. Tevens verhoogd het middel in combinatie met Fulvestrant de hormoongevoeligheid van borstkanker.

Fulvestrant is een geneesmiddel dat valt onder de endocriene therapie. Fulvestrant wordt voorgeschreven bij vrouwen die al in de overgang zijn (postmenopauzaal). Fulvestrant remt de aanmaak van oestrogeen. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de tumor zelfs kleiner kan worden. Naast de kankercellen in de borst bereikt Fulvestrant ook eventuele kankercellen die in het bloed en/of de lymfbanen terecht zijn gekomen (om zich elders in het lichaam te nestelen).

Het verloop van de behandeling

Medicatie die u in tabletvorm krijgt:

Palbociclib 125 mg	1x daags 1 capsule (gedurende 3 weken daarna 1 week geen medicatie)
--------------------	---

Medicatie die u via een onderhuidse injectie krijgt:

Fulvestrant 500 mg	1x per maand 2 injecties in de bilspier Tijdens de 1 ^e maand krijgt u eenmalig 2 extra injecties 14 dagen na de start.
--------------------	--

U kunt de Palbociclib alleen verkrijgen via de Jeroen Bosch Apotheek.

Gebruiksaanwijzing Palbociclib

- Neem de tabletten dagelijks in op een vast tijdstip.
- Neemt Palbociclib in met voedsel.
- Palbociclib capsules in zijn geheel innemen, niet op kauwen of fijn malen.
- Gebruik **geen Sint Janskruid** tijdens het gebruik van Palbociclib
- Tijdens de gehele behandeling met Palbociclib mag u **geen** grapefruit en grapefruitsap gebruiken. Deze producten kunnen namelijk de werking van de Palbociclib beïnvloeden.
- Bespreek elke verandering in uw geneesmiddelgebruik eerst met de behandelend arts/verpleegkundig specialist. Dit geldt ook voor homeopathische middelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de drogist. Sommige middelen mogen namelijk niet in combinatie met de voorgestelde behandeling gebruikt worden.

Hoe bewaard u Fulvestrant?

- U moet de injectievloeistof in de koelkast bewaren (2°C - 8°C).
- Bewaar het in de oorspronkelijke verpakking om de vloeistof tegen licht te beschermen.
- De arts mag de verpakking pas openen als u de Fulvestrant krijgt.

Als u een dosis bent vergeten of hebt uitgebraakt

- verdubbel niet de volgende dosis, maar volg het normale doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts/ verpleegkundig specialist.
- indien u braakt na inname van de medicatie neem dan de medicatie niet opnieuw in. Neem de volgende dosis in volgens het doseringsschema. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts/ verpleegkundig specialist.

Controles

Regelmatig vindt controle van het bloed en controlebezoek bij de arts of verpleegkundig specialist plaats.

Specifieke aandachtspunten Palbociclib

- verminderde eetlust, smaakverandering, misselijkheid en braken
- irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- huiduitslag
- vermoeidheid
- invloed op de werking van het beenmerg
- soms haarverlies (bij +/- 20% van de mensen), zelden volledige haaruitval

Specifieke aandachtspunten Fulvestrant

- Als u uitzaaiingen in de botten heeft, kan na het starten van Fulvestrant de pijn in de botten tijdelijk erger worden en daarna pas weer verminderen. Dit betekent niet dat de behandeling niet aanslaat. Aanhoudende en toenemende pijn zijn echter wel redenen om contact op te nemen met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.
- U moet Fulvestrant minimaal drie maanden gebruiken om te kunnen beoordelen of het medicijn werkt.
- U kunt pijn of een ontsteking krijgen op de plaats van injectie.
- U kunt last krijgen van maag/darmstoornissen, zoals misselijkheid, braken, diarree en verminderde eetlust.
- Fulvestrant kan soms vaginale klachten geven, zoals vaginale bloedingen, vaginale schimmelinfecties of vaginale witte vloed. Neem bij deze klachten altijd contact op met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.
- gewrichtsklachten
- osteoporose (botontkalking) en botbreuken
- trombose en hart- en vaatziekten
- acute benauwdheid
- overgangsverschijnselen. Meer informatie leest u in hoofdstuk 3 van de informatiewijzer endocriene therapie.

Afspraken

Wanneer u last krijgt van bijwerkingen van de Fulvestrant (uitgezonderd klachten die duiden op trombose of een longembolie) is het raadzaam om deze wanneer dat mogelijk is eerst enkele dagen tot weken aan te kijken. Vaak verdwijnen de klachten na verloop van tijd weer als uw lichaam zich op de behandeling heeft ingesteld.

Bespreek de bijwerkingen die u ondervindt in ieder geval ook met uw arts of verpleegkundig specialist. Zij kunnen u tips geven over hoe u de hinder die u van bijwerkingen ondervindt kan verminderen.

Bij vragen en /of onacceptabele bijwerkingen contact opnemen met het oncologisch centrum.