

Behandelschema: Trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) 3 wekelijks bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met targeted therapy (doelgerichte therapie). Het medicijn dat u krijgt, heet Kadcyla® (trastuzumab-emtansine).

De kuur wordt eenmaal per drie weken gegeven.

Afhankelijk van de respons en verdraagzaamheid wordt het aantal behandelingen bepaald.

De behandeling kan poliklinisch gegeven worden.

Het verloop van de kuur

1. Medicijnen die u via het infuus krijgt:
Trastuzumab emtansine: dag 1
2. Medicijnen die u in tabletvorm krijgt:
Metoclopramide 10 mg zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid gedurende maximaal 5 dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

De behandeling duurt tijdens de eerste toediening ± 2 uur. De volgende toedieningen duren ± 1 uur.

Controles

Controle van uw bloed: vóór start volgende kuur of op indicatie

Controle arts/verpleegkundig specialist: vóór start volgende kuur of op indicatie

Indien de bloedcellen zich tijdens de rustperiode niet voldoende hebben hersteld, bestaat de mogelijkheid dat de kuur één week wordt uitgesteld.

Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten

- Soms kunnen overgevoeligheidsreacties optreden. Dit houdt in: ademhalingsmoeilijkheden, een lage bloeddruk en een snelle hartslag.
- De meeste bijwerkingen treden op bij de eerste infusie. Hiervoor wordt de eerste keer langzamer toegediend en wordt er goed op u gelet.
- Trastuzumab-emtansine kan invloed hebben op de werking van uw hartspier, u krijgt daarom regelmatig hartfunctieonderzoek en uw bloeddruk en hartslag worden gecontroleerd
- Trastuzumab-emtansine blijft nog vele weken in het lichaam aanwezig. U moet uw arts en apotheek dan ook vertellen dat u Trastuzumab heeft gebruikt, als u in de eerste 6 maanden na het stoppen van Trastuzumab een ander geneesmiddel voorgeschreven krijgt. Tevens dient u alle bijwerkingen in deze periode nog te melden aan uw verpleegkundig specialist of behandelend arts.
- Er kan een griepachtig gevoel, rillerigheid, koorts, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn optreden; hiervoor mag u zo nodig Paracetamol 500 mg gebruiken
- Huiduitslag, jeuk, droge huid, acne, uitslag met vlekken en knobbeltjes kunnen voorkomen
- Diarree kan voorkomen
- Vermoeidheid en/of duizeligheid
- Perifere neuropathie:
U kunt klachten krijgen van een dof, dood gevoel in vingertoppen/voetzolen en/of prikkeling in uw handen of voeten. Dit wordt veroorzaakt door een beschadiging van de gevoelszenuwen. Na de eerste kuren trekt dit gevoel weer weg, maar het kan zo zijn dat de klachten naarmate u meer kuren krijgt, op de voorgrond komen te staan. Soms zijn deze klachten dan continue aanwezig. U dient dit altijd te melden bij een volgend polibezoek. Preventief kan er niets aan deze bijwerking gedaan worden, maar verergering zal voorkomen moeten worden door eventuele aanpassing van de dosering van de kuur.

- Iets hogere kans op urineweginfectie
- Trastuzumab-emtansine blijft 7 dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. U dient tijdens deze periode specifieke maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer.