

Behandelschema Denosumab

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Denosumab (Xgeva), een eiwit (monoklonaal antilichaam) dat de botafbraak vertraagt die wordt veroorzaakt door de uitzaaiingen van kanker naar het bot (metastasen). Uitzaaiingen in het bot maken uw botten broos. Dat kan tot vervelende gevolgen leiden, zoals botpijn of een breuk. Met Denosumab wordt het risico op deze botcomplicaties kleiner.

De duur van de behandeling wordt door uw medisch specialist bepaald. Meestal bedraagt de behandeling 2 tot 3 jaar. Denosumab kunt u zelf via een onderhuidse injectie toedienen, 1 x per 4 weken.

Tandartsbezoek voordat u start met Denosumab

Maak een afspraak bij uw tandarts om uw gebit te laten nakijken en saneren.

U dient uw tandarts op de hoogte te brengen van de voorgenomen behandeling met Denosumab, dit ivm het risico op osteonecrose van de kaak.

U krijgt hiervoor een brief mee van uw medisch - of verpleegkundig specialist.

Als uw gebit in orde is en uw tandarts is akkoord mag u starten met Denosumab.

Toediening van Denosumab

Door middel van een onderhuidse injectie in dijbeen, buik of achterkant van de bovenarm:

Denosumab 120 mg 1x per 4 weken een injectie

Levering van Denosumab

U kunt Denosumab ophalen bij de poliklinische apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, daar krijgt u instructies voor het zelf leren zetten van de spuit. Denosumab is een kant en klare spuit.

U krijgt elke keer per 3 maanden geleverd: dit zijn 3 toedieningen. Denosumab moet in de koelkast bewaard worden; neem daarom voor het vervoer van de spuiten een koeltasje/ koelelement mee.

Gebruik Calcium- en vit D supplement

Denosumab kan een tekort aan calcium in het bloed geven en daarom krijgt u ook calcium- en vitamine D supplement voorgeschreven. Uw medisch- verpleegkundig specialist schrijft hiervoor een recept uit en dit kunt u ook ophalen bij de poliklinische apotheek.

Mogelijke bijwerkingen (zeldzaam)

- Diarree
- Kortademigheid
- Bot, gewrichts- of spierpijn
- Transpireren
- Te lage calciumspiegel in het bloed
- Allergische reactie: zwelling in gezicht/ lippen, huiduitslag, netelroos

U moet direct contact opnemen met het ziekenhuis indien u de volgende klachten heeft; Denosumab mag dan NIET gegeven worden:

- Pijn in de mond of kaak, zwellingen of niet-genezende zweren in de mond of kaak, gevoelloosheid of zwaar gevoel in de kaak, of een tand die los gaat zitten. Dit kunnen tekenen zijn van botbeschadiging in de kaak (osteonecrose)
- Indien u een behandeling bij de tandarts moet ondergaan
- Spasmen, trekkingen of krampen in uw spieren en/of gevoelloosheid of tintelingen in uw vingers, tenen of rond uw mond. Dit kunnen tekenen zijn dat de calciumspiegel in uw bloed te laag is.