



Ryeqo[®]▼

relugolix, estradiol en norethisteronacetaat

EN IK



▼ Dit medicijn is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Je kan hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die je eventueel zou ervaren. Krijg je last van bijwerkingen, neem dan contact op met je arts of apotheker. Je kan ze ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb - Website: www.lareb.nl. Tot slot kunnen bijwerkingen ook gemeld worden aan Gedeon Richter Benelux (drugsafety.nl@gedeonrichter.eu).

Deze brochure werd ontwikkeld door Gedeon Richter Benelux en is enkel bedoeld voor patiënten die Ryeqo voorgeschreven krijgen. Deze brochure is geen vervanging van de bijsluiter. Lees de bijsluiter aandachtig door.

WAT ZIJN VLEESBOMEN?

Je hebt deze brochure van je behandelende arts gekregen omdat bij jou de diagnose werd gesteld van matige tot ernstige symptomen van vleesbomen en jou Ryeqo werd voorgeschreven.



HET EERSTE DAT JE MOET WETEN, IS DAT VLEESBOMEN ZEER VAAK VOORKOMEN

Je behandelende arts of apotheker heeft het wellicht over vleesbomen of myomen; verschillende termen die naar hetzelfde verwijzen.

Het zijn goedaardige gezwellen die groeien in en/of rond de baarmoeder.

De ontwikkeling van vleesbomen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een verstoord evenwicht in de concentraties van vrouwelijke hormonen (oestrogenen en progesteronen) in je lichaam. Vleesbomen variëren van nature sterk in vorm en omvang, en het is volkomen normaal om hetzij één, hetzij meerdere vleesbomen te hebben.

Het belangrijkste om te onthouden is dat ze **niet** levensbedreigend zijn en dat er behandelingen beschikbaar zijn om je te helpen.

VLEESBOMEN KOMEN ZEER VAAK VOOR... ONGEVEER 1 OP DE 3 VROUWEN KRIJGEN VLEESBOMEN

Als je na dit hoofdstuk nog zorgen of vragen hebt die niet beantwoord werden, contacteer dan je behandelende arts of apotheker – ze staan altijd klaar om je te helpen.





Ryeqo bevat drie
hoofdbestanddelen:

- relugolix
- estradiol
- norethisteron-
acetaat



HOE KAN RYEQO® ME HELPEN?

Door de aanwezigheid van vleesbomen of myomen kun je matige tot ernstige symptomen ervaren. Misschien heb je je arts verteld dat je het volgende hebt opgemerkt:

- abnormaal hevige menstruatiebloedingen
- pijn in de buik en/of onderrug
- onprettig gevoel in het bekken
- vermoeidheid en uitputting (bloedarmoede veroorzaakt door het bloedverlies)

**OM JE TE HELPEN DEZE
SYMPTOMEN TE BEHEERSEN,
HEEFT JE ARTS JE RYEQO®
VOORGESCHREVEN**

De drie bovengenoemde bestanddelen van Ryeqo helpen om je hormonale toestand op een niveau te houden vergelijkbaar met het begin van je menstruatiecyclus. Dit zorgt ervoor dat hevige menstruatiebloedingen verminderen, dat de pijn beter te beheersen is, de bloedarmoede en het algemene welzijnsgevoel verbeterd wordt en daarbij de sterkte van je botten behouden blijft.

Het is belangrijk om hierbij op te merken dat niet iedereen in dezelfde mate verlichting van de klachten ondervindt.

Als je je zorgen maakt over de werking van Ryeqo, spreek er dan over met je behandelende arts.



Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Informeer bij je behandelende arts of apotheker voor bijkomend advies.

WAAR MOET IK AAN DENKEN VOORDAT IK RYEQO® GEBRUIK?

Je arts heeft je gezondheidstoestand geëvalueerd en meent dat Ryeqo je kan helpen, maar het is belangrijk dat je zelf ook nagaat of dit medicijn geschikt voor je is.

Informeer je behandelende arts als je:

- zwanger bent, zou kunnen zijn of borstvoeding geeft
- andere medicijnen gebruikt, ook kruidenmiddelen en/of hormonale voorbehoedsmiddelen (zoals de anticonceptiepil)
- allergisch bent voor één van de bestanddelen in Ryeqo (zie bijsluiter)
- een risicopatiënt bent (geweest) voor bloedstolsels
- osteoporose hebt
- lijdt aan ernstige hoofdpijn of migraine
- kanker hebt gehad, ook borstkanker
- een leverprobleem hebt (gehad)



Raadpleeg altijd de bijsluiter in de verpakking van Ryeqo voor aanvullende informatie.



Het is raadzaam om met Ryeqo te beginnen in de eerste 5 dagen na de aanvang van je menstruatie. Als je met Ryeqo start op een ander tijdstip van de menstruatiecyclus, kun je in het begin onregelmatige of zwaardere bloedingen ondervinden.

HOE MOET IK RYEQO® INNEMEN?

Het medicijn zit in een plastic fles. Controleer voordat je Ryeqo gebruikt of de fles nog verzegeld is. Gebruik Ryeqo niet als de zegel verbroken is of ontbreekt. Breng in dat geval de fles terug naar de apotheker, die je een vervanging zal bezorgen.

RYEQO® WORDT ORAAL INGENOMEN (VIA DE MOND):

- neem slechts één tablet Ryeqo per dag
- probeer eraan te denken om je medicijn elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen (het kan helpen om een herinnering of alarm in te stellen op je mobieltje)
- je mag Ryeqo met of zonder voedsel innemen
- je mag Ryeqo met wat water innemen als je het moeilijk vindt om de tablet door te slikken



- ☑ Er zijn geen bijzondere bewaarvoorschriften voor Ryeqo, dus je hoeft dit niet in de koelkast of op een donkere plaats te bewaren. Houd het medicijn wel buiten het zicht en bereik van kinderen en dieren.
- ☑ Controleer de vervaldatum op de verpakking voordat je Ryeqo inneemt.
- ☑ Breng ongebruikte Ryeqo tabletten terug naar je apotheker.
- ☑ Spoel het medicijn niet door in de wc.

WAT MOET IK DOEN ALS IK BIJWERKINGEN KRIJG?

Zoals elk medicijn kan ook Ryeqo bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

JE KAN (MOGELIJK) DE VOLGENDE BIJWERKINGEN ONDERVINDEN:

- opvliegers
- overmatige, onregelmatige, of langdurige bloedingen uit de baarmoeder (uterusbloeding)
- haaruitval
- minder zin in seks
- prikkelbaarheid
- verhoogde zweetproductie
- een knobbeltje in het borstweefsel (borstcyste)
- verstoorde spijsvertering
- nachtelijk zweten

Voor de volledige lijst van bijwerkingen, gelieve de bijsluiter te raadplegen. Als je bijwerkingen ondervindt, spreek er dan zeker over met je behandelende arts.

Het kan zijn dat je merkt dat je normale menstruaties verminderen of zelfs uitblijven tijdens het gebruik van Ryeqo en daarna nog een paar weken lang. Dit is volkomen normaal, omdat de werking van Ryeqo ervoor zorgt dat je eisprong (ovulatie) wordt tegengehouden.

Als je echter te hevig blijft bloeden, moet je je behandelende arts informeren.



MOGELIJKE VRAGEN



Moet ik tijdens het gebruik van Ryeqo® mijn voorbehoedsmiddel staken?

In de eerste maand na aanvang met Ryeqo moet je nog niet-hormonale voorbehoedsmiddelen (bv. condooms) gebruiken. Je mag samen met Ryeqo geen enkele hormonale contraceptie (bv. de pil, pleister, staafje, hormoonspiraal,...) gebruiken.

Wat als ik vergeet om Ryeqo® in te nemen?

Als je een tablet vergeet, neem die dan in zodra je eraan denkt. Het is belangrijk dat je een vergeten tablet niet inhaalt door er twee op hetzelfde moment in te nemen. Als je langer dan 2 dagen je tablet vergeet in te nemen, moet je de volgende 7 dagen een niet-hormonaal voorbehoedsmiddel gebruiken (bv. condooms).

Wat als ik per ongeluk meerdere tabletten tegelijk inneem?

Als je per ongeluk meerdere Ryeqo-tabletten tegelijk inneemt, kan je wel last krijgen van misselijkheid, braken en/of vaginale bloedingen. Neem in dit geval steeds contact op met je behandelende arts of apotheker voor advies.

Mag ik Ryeqo® gebruiken als ik zwanger ben, een zwangerschap plan of borstvoeding geef?

Je mag Ryeqo niet gebruiken als je zwanger bent. Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn, wil je zwanger worden of geef je borstvoeding?

Neem dan contact op met je behandelende arts of apotheker voordat je dit medicijn gebruikt. Als je tijdens het gebruik van Ryeqo zwanger wordt, stop dan met het gebruik van Ryeqo en neem contact op met je behandelende arts.

Gebruik Ryeqo niet als je borstvoeding geeft.

Wat als ik wil stoppen met mijn medicijn?

Als je wil stoppen met Ryeqo, bespreek dit dan eerst met je behandelende arts, die zal je advies kunnen geven.

Als je nog vragen hebt over het gebruik van dit medicijn, stel ze dan aan je behandelende arts of apotheker. Zij zullen je graag helpen.





Onze medische
dienst is bereikbaar via
medinfo.nl@gedeonrichter.eu

Als je een klacht hebt over de
kwaliteit van het product, of je wilt een
bijwerking melden, neem dan contact
via drugsafety.nl@gedeonrichter.eu.

Voor alle andere vragen kun je
contact opnemen met ons via
info.benelux@gedeonrichter.eu



GEDEON RICHTER

Health is our mission