

Aandoening

Zweren in maag of twaalfvingerige darm

Bij een zweer is er een gat ontstaan in de beschermende slijmvlieslaag van de maag of twaalfvingerige darm.

Zweren kunnen hevige pijn in de maagstreek veroorzaken en in sommige gevallen zelfs leiden tot maagbloedingen. Heel soms kan ook een teken zijn van een onderliggende kwaadaardige aandoening.

Onderzoeken

Gastroscopie

Bij een gastroscopie bekijkt de arts het slijmvlies van uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm.

Dit gebeurt met behulp van een bestuurbare buigzame slang, de gastroscop. De slang wordt via uw keelholte naar binnen gebracht. Bij dit onderzoek kan de arts eventuele afwijkingen opsporen. In de folder 'Gastroscopie' leest u meer over dit onderzoek.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gastroscopie>

Behandelingen

Zweren in de maag of twaalfvingerige darm kunnen we behandelen met maag beschermende medicijnen (zuurremmers).

Verder is het belangrijk dat u stopt met eventuele schadelijke medicijnen zoals diclofenac of ibuprofen. Als de maagbacterie (*Helicobacter pylori* bacterie) bij u is gevonden, dan krijgt u een antibioticakuur.

Poliklinieken en afdelingen

Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

Het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) richt zich op de diagnostiek en behandeling van ziekten van het spijsverteringskanaal.

<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten-mdl>